

# Protocol Irbesartan

(Aprovel®150-300 mg)

## Indicatie:

Essentiële hypertensie. Nefropathie bij hypertensie en diabetes mellitus type 2 als onderdeel van een antihypertensieve behandeling.

Nog niet geregistreerd voor patiënten met hartfalen.

Bij patiënten die onvoldoende reageren op diuretica, ACE remmers en digoxine kan het toevoegen van een ARB overwogen worden.

## Gebaseerd op:

Geen studie bekend met hartfalenpatiënten

**Voor bijwerkingen, contra-indicaties en aandachtspunten zie algemeen protocol AT II-antagonisten.**

## Algemeen Irbesartan:

Mag gegeven worden bij verminderde leverfuncties, bij kreatinineklaring hoger dan 30 ml/min en ouderen (bij patiënten >75 jaar wordt aanbevolen te starten met 75 mg.)

## Dosering:

**Startdosis:** 1 x 75 of 150 mg

**Streefdosis:** 1 x 150 mg

**Streefdosis bij hypertensie:** 1 x 300 mg.

**Titratie dosis:** De dosis kan worden verdubbeld minimaal om de 2 tot 4 weken titreren of op geleide RR

Indien nodig dosis verhogen tot 1 x 300 mg.

✧ Bij duizeligheidsklachten na inname kan irbesartan vlak voor het slapengaan ingenomen worden.

**Controles:**

Bloeddruk, pols, ECG, gewicht, hartfalensymptomen en laboratoriumcontrole.

Zo nodig overleg met cardioloog.

Zie ook: **algemeen protocol AT II-antagonisten.**