

# Protocol Angiotensine II-antagonist Valsartan

(Diovan®)

## Indicatie:

Alle patiënten met hartfalen klasse II-IV of een EF < 45% die ACE-remmers niet kunnen verdragen.

Bij patiënten die onvoldoende reageren op diuretica, ACE-remmers en digoxine kan het toevoegen van een

AT II-receptorantagonist overwogen worden.

## Gebaseerd op:

Elite II en VALHEFT studie.

Practical recommendations for use of ACE inhibitors. McMurray J. et al. (*European Journal heart failure* 2001;3:495-502)

**Voor bijwerkingen, contra-indicaties en aandachtspunten zie algemeen protocol AT II-antagonisten.**

## Dosering:

**Startdosis:** 1 x 80 mg

**Effectieve dosis:** 2 x 80 mg

**Streefdosis:** 2 x 160 mg

**Titratie dosis:** De dosis kan worden verdubbeld minimaal om de 2 tot 4 weken, titreren op geleide van de bloeddruk.

✧ Bij duizeligheidsklachten na inname kan valsartan vlak voor het slapengaan ingenomen worden.

## Controles:

Bloeddruk, pols, ECG, gewicht, hartfalensymptomen en laboratoriumcontrole.

Zie ook: **algemeen protocol AT II-antagonisten.**

Zo nodig overleg met cardioloog.