

Verschillen tussen ACE-remmers

Geneesmiddel	Resorptie(%)	Plasmahalfwaarde-tijd (uren)	Doseringsfrequentie per dag bij						
			hyper-tensie	hartfalen	na m.i.	renovasculaire hypertensie	nierinsufficiëntie /nefropathie	diabetische nefropathie	preventie van cardiovasculaire aandoeningen
<u>benazepril</u>	> 37	10–11**	1–2	1–2	–	–	1	-	-
<u>captopril</u>	75	2–3	1–2	3	3	1–2	-	2–3	-
<u>cilazapril</u>	45–85	30–50*	1	1	–	–	-	-	-
<u>enalapril(aat)</u>	60–70	11	1–2	1–2	–	1–2	-	-	2 [□]
<u>fosinopril</u>	36	11,5*	1	1	–	–	-	-	-
<u>lisinopril</u>	25	12	1	1	1	1	-	1	-
<u>perindopril</u>	80	25*	1	1	–	–	-	-	-
<u>quinapril(aat)***</u>	60	1; 3	1–2	2	–	–	-	-	-
<u>ramipril</u>	50–60	13–17**	1	2	2	–	1	1	1
<u>trandolapril</u>	40–60	16–24**	1	–	1	–	-	-	-
<u>zofenopril</u>	volledig	5½	1	–	2	–	-	-	-

* eliminatiehalfwaardetijd
 ** effectieve halfwaardetijd na multi-pele doses
 *** remt ook ACE

m.i. myocardinfarct
 – niet geregistreerd voor deze indicatie
 □ bij asymptomatische LV dysfunctie (ejectiefractie ≤ 45 %)