

# Protocol $\beta$ -blokker Carvedilol (3,125-6,25-12,5-25 mg)

Eucardic<sup>®</sup> 6,25-25 mg

## Indicatie:

Hypertensie. Onderhoudsbehandeling van stabiele angina pectoris. Adjuvante behandeling bij standaardtherapie voor matig tot ernstig stabiel chronisch hartfalen NYHA II-IV. EF  $\leq$  40% op basis van systolische dysfunctie, zonder manifeste decompensatio cordis. Reeds ACE-remmer en diuretica.

## Gebaseerd op:

Copernicus (JAMA 2003;289:712-718), US Carvedilol HF studie (N Engl J Med 1996; 334:1349-1355)

**Voor bijwerkingen, contra-indicaties en aandachtspunten zie algemeen protocol  $\beta$ -blokkers.**

## Algemeen Carvedilol:

Bij patiënten ouder dan 80 jaar is enige terughoudendheid op zijn plaats omdat er weinig ervaring is met deze groep patiënten. Er kan een tijdelijke verergering van de klachten optreden. Herstel van de glucosespiegel na hypoglykemie kan worden vertraagd.

## Dosering:

### Startdosis:

(starten na stabiele instelling op overige hartfalenmedicatie, m.n. de ACE-remmers en de diuretica)

2 x 3,125 mg/dag

### Maximale dosis:

2 x 25 mg/dag < 85 kg lichaamsgewicht

2 x 50 mg/dag  $\geq$  85 kg lichaamsgewicht

### Titratie:

- ✧ Begindosering 3,125 mg tweemaal per dag gedurende 2 weken;
- ✧ vervolgens met intervallen van minimaal 2 weken verhogen tot achtereenvolgens 6,25 mg tweemaal per dag, 12,5 mg tweemaal per dag en 25 mg tweemaal per dag; max. dosering bij een lichaamsgewicht lager dan 85 kg is 25 mg tweemaal per dag, bij  $\geq$  85 kg lichaamsgewicht 50 mg tweemaal per dag. De dosering dient te worden verhoogd tot de hoogst getolereerde dosis.

**Een lage dosering  $\beta$ -blokker is altijd beter dan geen  $\beta$ -blokker!**

Start low, go slow.

**Controles:**

Bloeddruk, pols, ECG, gewicht, hartfalensymptomen en laboratoriumcontrole.

Zie ook: **algemeen protocol  $\beta$ -blokkers**.

Zo nodig overleg met cardioloog.

## Eucardic

