

# ACE-remmer Fosinopril

(NewAce® 10-20 mg)

## Indicatie:

- ✧ Hartfalen NYHA klasse II-IV hartfalen.  
Behandeling van patiënten met decompensatio cordis en een EF < 45%.
- ✧ Hartfalen NYHA klasse I.  
Behandeling van klinisch stabiele patiënten met asymptomatische linkerventrikel dysfunctie na een myocardinfarct of met een EF < 45%.

## Gebaseerd op:

Zannad et al, Am Heart J 1998

**Voor bijwerkingen, contra-indicaties en aandachtspunten zie algemeen protocol ACE-remmers.**

## Algemeen Fosinopril:

t ½ 12 uur, renale excretie 50%, geen dosisaanpassing bij nierfunctiestoornis (alleen startdosis).

Resorptietijd wordt lager door inname bij voedsel.

## Dosering:

**Startdosis:** 1 x 5 mg

**Effectieve dosis:** 1 x 20 mg

**Streefdosis:** 1 x 40 mg

**Titratieschema:** Minimaal om de 2 tot 4 weken titreren op geleide van RR en laboratorium. Titratie kan sneller tijdens opname en bij hypertensie. Op geleide van de verdraagbaarheid de dosering verhogen in stappen van max. 10 mg. Een kreatinestijging tot 25% is acceptabel.

- ✧ Bij duizeligheidsklachten na inname kan fosinopril vlak voor het slapengaan ingenomen worden.

## Controles:

Bloeddruk, pols, ECG, gewicht, hartfalensymptomen en laboratoriumcontrole.

Zie ook: **algemeen protocol ACE-remmers.**

Zo nodig overleg met cardioloog.