

Protocol ACE-remmer Lisinopril

(Zestril[®]-Novatec[®] 5-10-20-40 mg)

Indicatie:

- ✧ Hartfalen NYHA klasse II-IV.
Behandeling van patiënten met decompensatio cordis EF < 45%.
- ✧ Hartfalen NYHA klasse I.
Behandeling van klinisch stabiele patiënten met asymptotische linkerventrikel dysfunctie na een myocardinfarct of met een EF < 45%.

Gebaseerd op:

GISSI-3 (1994), ATLAS (1999)

Voor bijwerkingen, contra-indicaties en aandachtspunten zie algemeen protocol ACE-remmers.

Algemeen Lisinopril:

t ½ 12 uur, renale excretie 70%, dosisaanpassing bij nierfunctiestoornis. Als men de eerste dosis 's avonds voor het slapen inneemt, voorkomt men hypotensie-effecten zoveel mogelijk.

Dosering:

Startdosis: 1 x 2,5 mg

Streefdosis: 1 x 30-35 mg

Titratieschema: Minimaal om de 2 tot 4 weken titreren op geleide van bloeddruk en laboratorium, titratie kan sneller tijdens opname en bij hypertensie. Op geleide van de verdraagbaarheid door de patiënt de dosering verhogen in stappen van max. 10 mg. Een kreatinestijging tot 25% is acceptabel.

1e 1 x 2,5mg 2e 1 x 5 mg

3e 1 x 10 mg 4e 1 x 20 mg

5e 1 x 30 mg

Maximaal 30-35 mg per dag.

- ✧ Bij duizeligheidsklachten na inname kan lisinopril vlak voor het slapengaan ingenomen worden.

Controles:

Bloeddruk, pols, ECG, gewicht, hartfalensymptomen en laboratoriumcontrole.

Zo nodig overleg met cardioloog.

Zie ook: **algemeen protocol ACE-remmers**.