

# Protocol Angiotensine II-antagonist Losartan

(Cozaar® 50-100 mg)

## Indicatie:

.Patiënten met hartfalen klasse II-IV die ACE-remmers niet kunnen verdragen.

Bij patiënten die onvoldoende reageren op diuretica, ACE-remmers en digoxine kan het toevoegen van een

AT II-antagonist overwogen worden.

## Gebaseerd op:

Practical recommendations for use of ACE inhibitors. McMurray J. et al. (*European Journal heart failure* 2001;3:495-502)

**Voor bijwerkingen, contra-indicaties en aandachtspunten zie algemeen protocol AT II-antagonisten.**

## Dosering:

**Startdosis:** 1 x 25 mg

**Effectieve dosis:** 1 x 50 mg

**Streefdosis:** 1 x 100 mg

**Titratiedosis:** De dosis kan worden verdubbeld, minimaal om de 2 tot 4 weken, titreren op geleide RR.

✧ Bij duizeligheidsklachten na inname kan losartan vlak voor het slapengaan ingenomen worden.

## Controles:

Bloeddruk, pols, ECG, gewicht, hartfalensymptomen en laboratoriumcontrole.

Zo nodig overleg met cardioloog.

Zie ook: **algemeen protocol AT II-antagonisten.**