

# Protocol ACE-remmer **Ramipril**

(Tritace<sup>®</sup> 1,25-2,5-5-10 mg)

## **Indicatie:**

- ✧ Hypertensie + klasse II-IV hartfalen:  
Behandeling van hartfalen in combinatie met een diureticum (EF < 45%).
- ✧ Klasse I hartfalen.  
Behandeling van klinisch stabiele patiënten met asymptotische linkerventrikel dysfunctie na een myocardinfarct of met een EF < 45%.

## **Gebaseerd op:**

Aire studie (*Lancet* 1993;342:821-8, *Eur Heart J.* 1997; 18:41-51)

**Voor bijwerkingen, contra-indicaties en aandachtspunten zie algemeen protocol ACE-remmers.**

## **Algemeen Tritace:**

Resorptie: snel voor 50-60%. Eliminatie voornamelijk via de nieren.

## **Dosering:**

Bij hartfalen na een acuut myocardinfarct:

**Startdosis:** 1 x 2,5 mg.

**Streefdosis:** max. 1 x 10 mg.

### **Titratieschema:**

Per 2 weken dosis verdubbelen.

Indien de startdosering niet wordt verdragen, de dosis aanpassen naar 2 x 1,25 mg.

**Controles:**

Bloeddruk, pols, ECG, gewicht, hartfalensymptomen en laboratoriumcontrole.

Zie ook: **algemeen protocol ACE-remmers.**

Zo nodig overleg met cardioloog.